

Consulter rapidement un médecin si :

- Femme enceinte
- Enfant
- Apparition d'une plaque rouge autour d'une morsure ancienne : dans ce cas, ne tardez surtout pas
- Tique restée implantée plus de 24 heures
- Morsures multiples
- Tique gorgée de sang au moment de son extraction
- Victime immunodéprimée (traitement immunosuppresseur, VIH, ...)
- Apparition de symptômes : syndrome pseudogrippal, fièvre, fatigue, douleur, rougeur, symptôme atypique (neurologiques, cardiaques, ophtalmiques, psychiatriques, cutanés)

Sources : www.ameli-sante.fr - www.santepubliquefrance.fr

Après examen, le médecin pourra prescrire un traitement par antibiotiques.

Protégez-vous des morsures de tiques lors de vos promenades avec :

- Des vêtements longs, bras et les jambes couverts
- Serrant les poignets et les chevilles
- De couleur claire (repérage des tiques facilité)
- Chaussures fermées
- Chapeau / Couvre-tête
- Utilisez éventuellement un répulsif pour imprégner vos vêtements – *attention contre-indiqué pour les femmes enceintes et les petits enfants*
- Dès le soir, douche et inspection soigneuse de tout le corps (replis, cuir chevelu, zones génitales)

Comment enlever une tique ?

N'appliquez aucun produit mais utilisez un tire-tique en vente dans les pharmacies. Désinfectez ensuite.

Plus d'information sur www.mes-analyses-lyme.fr



Ce document ne remplace pas une consultation médicale.

Notre Réseau de laboratoires de Biologie médicale a développé une expertise sur les Maladies Vectorielles à Tiques. Demandez conseil à votre biologiste.

Cachet du laboratoire




Pour en savoir plus : www.mes-analyses-lyme.fr

Réseau SYNLAB



Danger : Tiques !

Maladies Vectorielles à Tiques



Informations destinées aux patients

www.mes-analyses-lyme.fr


Réseau SYNLAB

Quand les tiquent mordent

- Vampires** acariens suceurs de **sang**
- Nuisibles** larves, nymphes, tiques adultes : toutes mordent **hommes et animaux**
- À l'affût** dans **l'herbe en campagne** (champs, bois, prairies) et **en ville** (parcs, jardins)
- Cachées** dans les **replis de peau**, aisselles, arrière des genoux, zones génitales
- Dangereuses** "poches à microbes" pouvant transmettre jusqu'à **5 bactéries** pathogènes

CARTE DES ZONES À TIQUES : INVASION

Les tiques seraient répandues sur tout le territoire français, y compris sur le pourtour méditerranéen et en Corse.



La Maladie de Lyme et ses phases

La morsure de la tique peut entraîner l'apparition de la **Maladie de Lyme** (Borreliose) et des co-infections.

APRÈS LA MORSURE

2 à 45 jours

1- La phase précoce

- Erythème migrant
- Syndrome pseudo grippal



Plusieurs semaines/mois

2- La phase tardive

(secondaire et/ou tertiaire)

- Atteintes neurologiques
- Douleurs articulaires (arthrite de Lyme)
- Atteintes de la peau, des articulations, et d'autres organes



Le nombre de personnes atteintes en France de la Maladie de Lyme est évalué officiellement à 27 000 : il serait largement sous-estimé, selon les associations de patients et plusieurs autorités médicales.

Pourquoi faire une analyse de sang ?

Les analyses de sang sont recommandées surtout dans la phase tardive de la **Maladie de Lyme** pour aider à poser le diagnostic.

Comment faire une analyse ?

Vous vous rendez au laboratoire d'analyses médicales **avec une prescription ou sans** (dans ce cas pas de remboursement par la Sécurité Sociale).

Votre biologiste prélève votre sang et envoie l'échantillon sanguin au **centre spécialisé** de notre Réseau.

Les **résultats vous sont communiqués** par courrier ou sur votre espace patient internet.

Les résultats sont aussi envoyés à votre **médecin** traitant.



Les résultats

- L'**interprétation** des comptes-rendus de sérologie nécessite compétence et expérience.
- Un résultat positif peut par exemple révéler une infection ancienne qui n'a plus évolué.
- Notre Réseau de laboratoires met à votre disposition les **techniques** parmi les plus avancées et performantes.
- **Nos biologistes spécialisés dialoguent avec votre médecin sur l'interprétation des résultats pour une prise en charge médicale optimale.**